Faunitaxys

Revue de Faunistique, Taxonomie et Systématique morphologique et moléculaire

Volume 13
Numéro 63

Décembre 2025

ISSN (Print) : 2269 - 6016
ISSN (Online) : 2970 - 4960
Dépôt légal : Décembre 2025

Faunitaxys

Revue de Faunistique, Taxonomie et Systématique morphologique et moléculaire

ZooBank : https://zoobank.org/79A36B2E-F645-4F9A-AE2B-ED32CE6771CC

Directeur de la publication, rédacteur, conception graphique et PAO:
Lionel Delaunay

Cette revue ne peut pas être vendue
Elle est distribuée par échange aux institutions (version papier)
et sur simple demande aux particuliers (format PDF)
à l'adresse suivante:

AFCFF (Association française de Cartographie de la Faune et de la Flore)
28, rue Voltaire, F- 42100 Saint Etienne
E-mail: faunitaxys.journal@gmail.com

Elle est disponible librement au téléchargement à partir du site:

https://faunitaxys.fr/

La parution de *Faunitaxys* est apériodique

Faunitaxys est indexé dans / ***Faunitaxys*** is indexed in:
- Zoological Record
Articles and nomenclatural novelties are referenced by:
- ZooBank (https://zoobank.org)
Online Archives:
- HAL (https://hal.archives-ouvertes.fr)
- Internet Archive (https://archive.org/details/faunitaxys)

Imprimée sur les presses de SPEED COPIE, 6, rue Tréfilerie, F- 42100 Saint-Etienne

Imprimé le 30 12 2025

Ctenuchina de Guyane française (2de partie). Les genres *Ptychotricos* - *Delphyre* - *Druceius* - *Aderithales* - *Moeschlerius* - *Hyaleucerea* - *Nitoris* & *Fraudulentus* (2d article). 18e note

JEAN-AIMÉ CERDA

BP 98, 97357 Matoury Cedex, Guyane française - patawa2@gmail.com
- ZooBank : https://zoobank.org/CA09A38F-CFCC-47BB-BE4F-C632F6AD83C6

Mots-clés :

Erebidae ;
Arctiinae ;
Arctiini ;
Ctenuchina ;
Ptychotricos ;
Delphyre ;
Druceius ;
Aderithales ;
Moeschlerius ;
Hyaleucerea ;
Nitoris ;
Fraudulentus ;
Guyane française.

Résumé. – Dix espèces sont traitées : *Ptychotricos zeus* Schaus, 1894, *Delphyre espinozai* Cerda, 2020, *Druceius pernauti* Cerda, 2020, *Aderithales aoris* (Möschler, 1878), *Moeschlerius obscurus* (Möschler, 1872), *Hyaleucerea erythrotela* (Walker, 1854), *Hyaleucerea cincta* (Schaus, 1896), *Nitoris suffusus* (Lathy, 1899), *Nitoris aureus* Cerda, 2020, *Fraudulentus metoidesis metoidesis* (Hampson, 1905).

Cerda J.-A., 2025. – Ctenuchina de Guyane française (2de partie). Les genres *Ptychotricos* - *Delphyre* - *Druceius* - *Aderithales* - *Moeschlerius* - *Hyaleucerea* - *Nitoris* & *Fraudulentus* (2d article). 18e note. *Faunitaxys*, 13(63) : 1 – 17.

DOI : https://doi.org/10.57800/faunitaxys-13(63)

ZooBank : https://zoobank.org/B13462C2-7101-47F1-ABEF-7AF6F3184419

Received: 11/11/2025 – *Revised*: 17/11/2025 – *Accepted*: 18/11/2025

Collections examinées

JAC : Jean-Aimé Cerda,
PC : Philippe Collet,
SF : Serge Fernandez,
BF : Bernard François,
BH : Bernard Hermier,
ML : Michel Laguerre,
OL : Olivier Laurent,
TR : Thibault Rosant,
TT : Tony Tassel.

Anagrammes des institutions

- **USNM** : United States National Museum (Washington),
- **ZMHU** : Zoologisches Museum der Humboldt Universität (Berlin),
- **NHM** : Natural History Museum (Londres).

Ptychotricos Schaus, 1894

Espèce type : ***Ptychotricos zeus*** Schaus, 1894, par monotypie.

• ***Ptychotricos zeus*** Schaus, 1894.

(Pl. 1, Fig.1 ; Pl. 3, Fig. 11a-f)

Ptychotricos zeus Schaus, 1894, Proc. Zool. Soc. Lond.: 228.
- Venezuela : Aroa.

Ptychotrichos [*sic*] *zeus*; Hampson, 1898, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. 1: 477, fig. 263. [Orthographe subséquente incorrecte].
- Venezuela.

Ptychotrichus [*sic*] *zeus*; Zerny, 1912, Lepidopterorum Catalogus 7: 135. [Emendation erronée].
- Venezuela.

Ptychotrichus [*sic*] *zeus*; Draudt, 1916, *in* Seitz, Macrolép. du Globe 6 [version française]: 174, pl. 24, fig. c[3].
- Vénézuéla.

Ptychotrichos [*sic*] *zeus*; Zerny, 1931, Ann. Naturh. Mus. Wien, Bd. 45: 254.
- Pará : Taperinha [février, mai, juillet- août] ; Venezuela : Aroa.

Ptychotrichos [*sic*] *zeus*; Hagmann, 1938, Liv. Jubilar. Prof. Travassos, Rio Janeiro: 193.
- Pará ; Guyanas ; Venezuela : Rio Caura e Ilha Trinidade. [In part.].

Ptychotrichos [*sic*] *zeus*; Blest, 1964, Zoologica 49(3): 167.
- [Panamá] : Barro Colorado.

Ptychotricus [*sic*] *zeus*; Betz, 1980, Bull. Soc. Entomol. Fr. (85): 92. [Orthographe subséquente incorrecte].
- Brésil septentrional : Moyen Xingu (Gorotire, septembre-octobre).

Ptychotricos zeus; Watson, Fletcher & Nye, 1995, Noctuoidea: Arctiidae to Thyretidae *in* Nye: 166.
- Venezuela : Aroa.

Ptychotrichus [*sic*] *zeus*; Grados, 1999, Rev. Peru. Entomol. 41: 12.
- Perú : Zona Reservada Tambopata-Candamo, Madre de Dios.

Ptychotrichos [*sic*] *zeus*; Grados, 2001, Rev. Peru. Entomol. 42: 65.
- Perú : región del Bajo, Río Urububamba, Cuzco (Las Malvinas 380-480m).

Ptychotricos zeus; Teston, Novaes & Almeida Júnior, 2012, Acta Amazonica 42(1): 108.
- Brasil : Pará (Altamira).

Ptychotricos zeus; Teston & Correa, 2015, Check List 11(2): 4.
- Brasil : Pará (Serra do Pardo National Park).

Ptychotrichos [*sic*] *zeus*; Pinheiro & Duarte, 2017, Zootaxa 4312 (2): 248, fig. 1-3, 7-15. [Emendation injustifiée]
- Bolivia ; Brazil : Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia ; Costa Rica : Guanacaste, Puntarenas ; French Guiana ; Panama : Barro Colorado Isl., Veraguas ; Peru : Cusco, Junin, Madre de Dios ; Venezuela : Aroa, Caura Valley, Aragua, Carabobo, Lara, Mérida, Miranda, Táchira, Zúlia. [Voir la publication pour toutes les coordonnées géographiques].

Reviewer : Michel Laguerre (*Université de Bordeaux, France*) - https://orcid.org/0000-0002-6524-7069 - https://zoobank.org/2146C3FF-355D-4649-AB4B-20BE73BDC602

This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs License, which permits use and distribution in any medium, provided the original work is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.
Copyright 2025. The Authors. *Faunitaxys* published by Lionel Delaunay on behalf of the AFCFF (Association française de Cartographie de la Faune et de la Flore).

Notes. – Pinheiro & Duarte [2017], considèrent *Ptycotrichos* la bonne orthographe, ils écrivent: "the omission of the "h" in the word "*trichos*" probably constitutes a *lapsus calami*. However, in the absence of clear evidence of inadvertent error in the original publication, it did not need correction (ICZN, article 32.5.1). But Hampson (1898) corrected it anyway, citing Schaus' (1894) authorship. Given that *Ptychotrichos* has since then been used, it is in prevailing usage, and must therefore be used (ICZN, article 33).
Nous avons considéré *Ptycotricos* être une bonne orthographe, τριχος (cheveu), peut se retrouver translittéré en, *tricho* ou *trico* (*cf.* Borror, *Dictionary of word roots and combining forms* p.105). Il n'y a donc pas ici de *lapsus calami* et l'appel à l'article 33.2.3.1 pour faire de *Psychotrichos* une émendation justifiée n'est pas fondé (voir « usage prédominant » Glossaire du code).
Nous n'avons pas pu disséquer ni séquencer de spécimens du Panama et du Costa Rica. Ces localités devront être confirmées.

Pinheiro & Duarte [2017], consider *Ptycotrichos* to be the correct spelling, they write: "the omission of the "h" in the word "*trichos*" probably constitutes a *lapsus calami*. However, in the absence of clear evidence of inadvertent error in the original publication, it did not need correction (ICZN, article 32.5.1). But Hampson (1898) corrected it anyway, citing Schaus' (1894) authorship. Given that *Ptychotrichos* has since then been used, it is in prevailing usage, and must therefore be used (ICZN, article 33).
We have considered *Ptycotricos* to be a correct spelling, τριχος (hair), can be transliterated as, *tricho* or *trico* (see Borror, *Dictionary of word roots and combining forms* p.105). There is therefore no *lapsus calami* here, and that the appeal to article 33.2.3.1 to make *Psychotrichos* a justified emendation is unfounded (see "predominant usage" Glossary of the Code).
We were unable to dissect or sequence specimens from Panama and Costa Rica. These localities will need to be confirmed.

Photo de l'holotype de *Ptychotricos zeus* (USNM) examinée.

A photograph of the holotype of *Ptychotricos zeus* (USNM) has been examined.

Espèce capturée au piège lumineux.

Species caught at light trap.

Matériel examiné. – 15 spécimens (coll. JAC, PC, TR, BH, TT, ML, SF).

Guyane française

Zone Camopi : Dégrad Laurens ;
Zone Coralie-Cacao : pistes forestières de Coralie ;
Zone Bas-Maroni : village Espérance ;
Zone Centrale : Saül (aérodrome) ;
Zone Haut-Maroni : Antecume Pata.

- Mars, juin, d'août à octobre, décembre-janvier.

Brésil : Rondonia : Cacaulandia. Novembre.

Bolivie

- Béni : Yucumo. Novembre.
- Santa Cruz : Camiri. Octobre.

Delphyre Walker, 1854

Espèce type : ***Delphyre hebes*** Walker, 1854, par monotypie.

• ***Delphyre espinozai*** Cerda, 2020

(Pl. 1, Fig. 2 ; Pl. 3, Fig. 12a-f)

Delphyre espinozai Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9 : 8 ; pl.1, fig. 2 & 6a-e.
- Guyane : Mtgne de Kaw (pk.42 & Patawa).

Notes. – Hampson [1914], Draudt [1916] et Fleming [1950], signalent *Delphyre hebes* au Guyana, il devrait plutôt s'agir de *D. espinozai*.

Hampson [1914], Draudt [1916] and Fleming [1950], report *Delphyre hebes* in Guyana, it should rather be *D. espinozai*.

Espèce capturée au piège lumineux et aux pyrrolizidine.

Species caught at light trap, and with pyrrolizidine baits.

Matériel examiné. – 17 spécimens (coll. JAC, PC, ML, OL, SF).

Guyane française

Zone Oyapock : Approuague (saut Mapaou) ;
Zone Ouanary : Monts de l'Observatoire ;
Zone Mtgne de Kaw : Patawa, route de Kaw (pk.42) ;
Zone Montsinéry : la Mangrove ;
Zone Kourou : N1 (pk.70) ;
Zone Sinnamary : Pointe Combi **;**
Zone Centrale : Saül (bourg & environs) ;
Zone Haut-Maroni : Papaïchton (Amadou).

- Mars, juin, août, d'octobre à janvier.

Druceius Cerda, 2020

Espèce type : ***Epanycles gigantea*** Druce, 1884, par désignation originale.

• ***Druceius pernauti*** Cerda, 2020

(Pl. 1, Fig. 3 ; Pl. 3, Fig. 13a-f)

Druceius pernauti Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n °9 : 14 ; pl. 2, fig. 10 & 14a-f.
- Guyane : Crique Sapokaï (Dégrad Laurens).

Espèce capturée au piège lumineux.

Species caught at light trap.

Matériel examiné. – 13 spécimens (coll. JAC, PC, SF).

Guyane française

Zone Trois Saut : Mont St. Marcel ;
Zone Camopi : Dégrad Laurens ;
Zone Oyapock : Approuague (Saut Mapaou) ;
Zone Bélizon : pistes forestières ;
Zone Centrale : Saül (bourg, environs et Mont Galbao).

- Janvier-février, de juillet à octobre.

Aderithales Cerda, 2020

Espèce type : ***Eucereon aoris*** Möschler, 1878, par désignation originale.

• ***Aderithales aoris*** (Möschler, 1878)

(Pl. 1, Fig. 4 ; Pl. 5, Fig. 19a-e)

Eucereon aoris Möschler, 1878, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien XXVII: 647, pl. VIII, fig.16.
- Innern Surinams.

Eucereon aoris; Kirby, 1892, Syn. Cat. Lepid. Heterocera 1: 199.
- Surinam.

Eucereon aoris; Hampson, 1898, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. 1: 509.
- Surinam.

Eucereum [*sic*] *aoris*; Zerny, 1912, Lepidopterorum Catalogus 7: 138. [Emendation erronée].
- Surinam.

Eucereon aoris; Draudt, 1916, *in* Seitz, Macrolép. du Globe 6 [version française]: 190, pl. 25, fig. g[4].
- Surinam.

Eucereon aoris; Zerny, 1931, Dtsch. Entomol. Z., Dresden, Bd. 45: 24.
- Französisch-Guyana.

Eucereon aoris; Zerny, 1931, Ann. Naturh. Mus. Wien, Bd. 45: 261.
- Pará (Taperinha[juillet-août, d'octobre à décembre] ; Venezuela (Caura-Tal) ; Holl.-und Franz.-Guyana.

Eucereon aoris; Hagmann, 1938, Liv. Jubilar. Prof. Travassos, Rio Janeiro: 194.
- Pará ; Guyanas ; Venezuela : Rio Caura e Ilha Trinidade. [In part.].

Eucereon aoris; Forbes, 1939, Bull. Mus. Comp. Zoöl. 85(4): 158.
- Panama : Barro Colorado Island ; Surinam. [In part.].

Eucereon aoris; Betz, 1974, Ann. Soc. Entomol. Fr. (79): 41.
- Guyane Française : Saül (avril), Tumuc Humac, St. Jean du Maroni ; Surinam.



Planche 1. Habitus (recto-verso).

1. *Ptychotricos zeus* ♂. **2**. *Delphyre espinozai* holotype ♂. **3**. *Druceius pernauti* holotype ♂. **4**. *Aderithales. aoris* ♂. **5**. *Moeschlerius obscurus* ♂.

Eucereon aoris; Teston & Delphina, 2010, Acta Amazonica 40(2) : 390.
- Brazil : Pará (Altamira [janvier]).

Eucereon aoris; Delphina & Teston, 2013, Acta Amazonica 43(1) : 84.
- Brazil : Pará (Altamira [octobre]).

Eucereon aoris; Teston & al., 2019, Biota Neotrop. 19(2): 9.
- Brazil : Amazonas (Manicoré), Mato Grosso (Sinop), Pará (Altamira-Monte Santo), Belterra (National Forest of Tapajós), Santarem (Taperinha).

Aderithales aoris; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n °9 :15-19 ; pl.3, fig. 17 & 21a-e.
- Guyane.

Notes. – *Eucereon aoris*; Blest [1964], et Pinas & Manzano [2003], sont de mauvaises identifications, cette espèce doit être supprimée de la faune du Panama et d'Equateur. Ces spécimens sont pour le moment indéterminés.

Eucereon aoris; Blest [1964], and Pinas & Manzano [2003], are misidentifications, this species is to be removed from the fauna of Panama and Ecuador. These specimens are currently undetermined.

Photo de l'holotype d'*Eucereon aoris* (ZMHU) examinée.

A photograph of the holotype of *Eucereon aoris* (ZMHU) has been examined.

Espèce capturée au piège lumineux, au piège Malaise, sur fleurs et aux pyrrolizidine.

Species caught at light trap, by Malaise trap, on flowers and with pyrrolizidine baits.

Matériel examiné. – 89 spécimens (coll. JAC, PC, TR, BH, TT, BF, ML, OL, SF).

Guyane française

Zone Camopi : Dégrad Laurens ;
Zone Oyapock : St. Georges (Bourg), N2 (pk. 76,5, 79, 125 [piste Crique Kapiri] & 128), Approuague (saut Mapaou) ;
Zone Nouragues-Arataï : Mont Chauve ;
Zone Bélizon : piste forestière, auberge de l'Approuague ;
Zone Coralie-Cacao : Cacao, piste forestière de Coralie, Camp Changement ;
Zone Montsinéry : rte de Nancibo (pk.3), Galion, piste de Saut Léodate (pk.18) ;
Zone Mtgne de Kaw : route de Kaw (pk.31, 37 & 40), Patawa ;
Zone Sinnamary : route de petit Saut (pk.22), Pointe Combi, Cirad de Combi ;
Zone Mtgne Trinité : haut Courcibo ;
Zone Iracoubo : Mtgne de fer ;
Zone Bas-Maroni : D11 (pk.7,5), village Espérance, plateau des Mines, Moutouchi, Awara, piste Paul Isnard, piste Crique Serpent, Camp Maïpouri, route d'Apatou (pk.29) ;
Zone Grand Santi : à 3km de l'aérodrome ;
Zone Centrale : Haute Mana (St. Léon), Saül (bourg & environs, aérodrome, Mt. Galbao) ;
Zone Tumuc Humac : Mitaraka-sud, Mamilhipan (Roche Susky).
- D'août à juin.

Venezuela : Bolivar : El Dorado. Août.

Moeschlerius Cerda, 2020

Espèce type : ***Aclytia obscura*** Möschler, 1872, par désignation originale.

• ***Moeschlerius obscurus*** (Möschler, 1872)

(Pl. 1, Fig. 5 ; Pl. 3, Fig. 14a-f)

Aclytia obscura Möschler, 1872, Entomol. Zeitung.: 348.
- Cayenne.

Epanycles obscura; Butler, 1878, Trans. Entomol. Soc. I: 46.

Epanycles obscura; Möschler, 1878, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien XXVII: 645, pl. VIII, fig.16.
- Surinam ; Cayenne.

Epanycles obscura; Druce, 1884, Insecta. Lepidoptera-Heterocera. Biologia Centrali Americana Vol. I : 80.
- Panama : Bugaba ; Amazons.

Epanycles obscura; Druce, 1897, Biologia Centrali Americana Vol. I : p. 358.
- Mexico : Jalapa (Orizaba), Tabasco (Teapa) ; Costa Rica (Santa Clara Valley).

Epanycles obscura; Kirby, 1892, Syn. Cat. Lepid. Heterocera 1: 173.
- Cayenne ; Amazons ; Panama.

Eucereon obscurum; Hampson, 1898, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. 1: 490.
- Mexico : Tabasco ; Costa Rica ; Panama ; Cayenne ; Amazons (Rio Jutahi).

Aclytia obscura; Druce, 1899, Insecta. Lepidoptera-Heterocera. Biologia Centrali Americana Vol. 2 : 571.

Epanycles obscura; Druce, 1899, Insecta Lepidoptera-Heterocera. Biologia Centrali Americana Vol. 2 : 588.

Eucereon obscurum; Schrottky, 1909, D. Entomol. Zeit."Iris": 135.
- Paraguay ; Amazonas bis Zentral-Amerika (Mexico).

Eucereum obscurum; Zerny, 1912, Lepidopterorum Catalogus 7: 141. [Emendation erronée].
- Mexico ; Costarica ; Panama ; Surinam ; Amazonas ; Paraguay.

Eucereon obscurum; Draudt, 1916, *in* Seitz, Macrolép. du Globe 6 [version française]: 182, pl. 24, fig. h[3].
- Du Mexique à l'Amazone.

Eucereum [*sic*] *obscurum*; Zikán, 1928, Entomol. Rundsch. 45(10): 39.
- [Brazil] Itatiaya (Campo-Bello).

Eucereon obscurum; Zerny, 1931, Dtsch. Entomol. Z., Dresden, Bd. 45: 22.
- Bolivien : Rio Songo, Coroico.

Eucereon obscurum; Zerny, 1931, Ann. Naturh. Mus. Wien, Bd. 45: 259.
- Pará (Taperinha[de janvier à mars, de juillet à septembre] ; Mexico ; Costa Rica ; Panama ; Surinam ; Amazonas (Rio Jutahy) ; Bolivien ; [Brazil] : Bahia, Esperito Santo (Faz. Jerusalem), Itatiaya ; Paraguay.

Eucereon obscurum; Hagmann, 1938, Liv. Jubilar. Prof. Travassos, Rio Janeiro: 194.
- [Brazil] : Pará, Sul do Paiz ; Bolivia ; Perú ; Equador ; Colombia ; Guyanas ; Venezuela : Rio Caura e Ilha Trinidade.

Eucereon obscurum; Anduze, 1938, Bol. Soc. Venez. Cien. Nat. IV(32): 306
- Venezuela : Car[acas].

Eucereon obscurum; Forbes, 1939, Bull. Mus. Comp. Zoöl. 85(4): 101&154.
- Panama : Barro Colorado Island ; Honduras (Lancetilla) ; Mexico to Amazons.

Eucereon obscurum; Travassos, 1940, Arq. Zool. Est. S. Paulo II(9) : 275
- Mexico ; Honduras ; Costa Rica ; Panama ; Venezuela ; Colômbia ; Trinidade ; Guianas ; Perú ; Equador ; Bolívia ; Brasil : Amazonas, Pará, Mato Grosso (Salobra) ; Paraguay.

Eucereon obscurum; Forbes, 1942, Bull. Mus. Comp. Zoöl. 90(2): 269 & 274.
- Panama : Barro Colorado Island.

Eucereon obscurum; Lichy, 1943, Bol. Soc. Venez. Cien. Nat. VIII(55): 231.
- Venezuela.

Eucereon obscurum; Beebe & Kenedy, 1957, Zoologica 42(4) : 149, 154-156, pl.1, fig. 11.
- Trinidad ; Mexico and Central America south to the Amazons.

Eucereon obscurum; Fleming, 1959, Zoologica 44(3): 97, pl.3, fig. 2.
- Trinidad ; Mexico to the Amazons.

Eucereon obscurum; Blest, 1964, Zoologica 49(3): 166-174, fig. 14.
- [Panama] : Barro Colorado.

Eucereon obscurum; Betz, 1972, Ann. Soc. Entomol. Fr. 8(2): 406.
- Guyane Française : Cayenne ; du Mexique à l'Amazone en passant par le Surinam.

Eucereon obscurum; Betz, 1974, Ann. Soc. Entomol. Fr. (79): 41.
- Guyane Française : Saül (avril), Cayenne ; du Mexique au Surinam et à l'Amazone.

Eucereon obscurum; Betz, 1980, Bull. Soc. Entomol. Fr. (85): 91.
- Guyane Française : Kourou, Moloko Imene.

Eucereum [*sic*] *obscurum*; Grados, 1997, Biodiversity Assessment & Monitoring, *SI/MAB Serie*# 1: 130.
- Perú : lower Urubamba region.

Eucereon obscurum; Grados, 1999, Rev. Peru. Entomol. 41: 12.



Planche 2. Habitus (recto-verso).

6. *Hyaleucerea. cincta* ♂. **7**. *Hyaleucerea erythrotela* ♂. **8**. *Fraudulentus metoidesis* ♂. **9**. *Nitoris suffusus* ♂. **10**. *Nitoris aureus* paratype ♂.

- Perú : Madre de Dios (reservada Tambopata-Candamo).

Eucereon obscurum; Grados, 2001, Rev. Peru. Entomol. 42: 65.
- Perú : Cuzco-región del Bajo Río Urubamba (Segakiato 280m, Las Malvinas 380-480m, San Martín 475m, Cashiriari 590m).

Eucereon obscurum; Piñas & Manzano, 2003, Mariposas del Ecuador vol.21b : 32, fig. 171-172.
- Ecuador : Costa-Esmeraldas (San Lorenzo 2280m).

Eucereon obscurum; Hernandez-Baz & al., 2004, Rev. Nic. Entomol. 64: 6.
- Nicaragua : Rio San Juan (Bartola), Zelaya (Cicabo).

Eucereon obscurum; Miller & al., 2012, Insecta Mundi 0205: 33.
- Honduras : La Ceiba (Pico Bonito).

Eucereon obscurum; Hernandez-Baz, 2012, Universidad Veracruzana Centro de Investigaciones Tropicales: 138 & 263, tab. 6.
- Mexico : Chi[apas], Tab[asco], Ver[acruz].

Eucereon obscurum; Teston, Novaes & Almeida Júnior, 2012, Acta Amazonica 42(1): 108.
- Brasil : Pará (Altamira).

Eucereon obscura [sic]; Turrent-Diaz & al., 2013, Revista de la Sociedad Mexicana de Lepidopterología 1(1): 11.
- [Mexico] : Chiapas (région de Chajul).

Eucereon obscurum; Delphina & Teston, 2013, Acta Amazonica 43(1): 84.
- Brasil : Pará (Altamira).

Eucereon obscurum; Teston & al., 2019, Biota Neotrop. 19(2): 10.
- Brazil : Amazonas (Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutai-Rio Jutai, Manicoré, São Paulo de Olivença), Amapa (Serra do Navio), Maranhão (Açailândia), Pará (Altamira, Belem, Belterra-National Forest of Tapajós), Breves, Santarem-Taperinha, Viseu), Rondonia : Porto Velho.

Eucereon obscurum; Araujo, Pinheiro & Duarte, 2019, Zootaxa, 4613(1): 188-189, fig. 1d.
- Brazil : Amapa (Serra do Navio).

Moeschlerius obscurus; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9 : 22-24, fig. 11 ; pl.2, fig.12 & 16a-f.
- Guyane ; [Brésil] : Maranhão ; Panama ; Costa Rica ; Pérou ; Equateur ; Argentine.

Epanycles stellifera Butler, 1877, Ill. of Typ. Speci. of Lepid. Het. in the coll. of the B. M.: 48, pl. 16, fig. 10.
- [Brazil] : Rio Jutahi.

Epanycles stellifera; Araujo, Pinheiro & Duarte, 2019, Zootaxa, 4613(1): 187.

Historique. – Butler [1878], considére *stellifera* Butler, 1877 comme un synonyme plus récent d'*obscura*.

Butler [1878], considers *stellifera* Butler, 1877 as a junior synonym of *obscura*.

Notes. – Butler [1878] et Möschler [1878], signalent *stellifera* Butler, 1877, comme un synonyme plus récent d'*obscura*. La publication de Butler a été publiée en avril, nous n'avons pu trouver la date de parution de la publication de Möschler. Nous avons suivi Araujo, Pinheiro & Duarte [2019] qui mentionent Butler, être l'auteur du changement de statut de *stellifera*.
Dans BOLD, *M. obscurus* apparaît sous 4 BINs : [AAD0077], [AAF1123], [ACE5637], et[ACB6506]. Nous avons considéré que le BIN AAD0077 représente *Moeschlerius obscurus*, espèce présente du Costa Rica à l'Argentine en passant par la Guyane. Il est à noter que sous le même habitus, 3 espèces indéterminées sont présentes, au Costa Rica [ACE5637], au Panama [AAF1123] et en Guyane [ACB6506].
Dans la liste des références ci-dessus, un doute subsiste sur les spécimens situés au nord du Costa Rica : Nicaragua, Honduras et Mexique, car aucun spécimen de ces pays n'a été séquencé. Un doute subsiste aussi avec les spécimens d'Equateur qui sont les plus distants des spécimens de Guyane. Ceux-ci devront être disséqués pour confirmer leur conspécificité.

Butler [1878] and Möschler [1878], report *stellifera* Butler, 1877, as a junior synonym of *obscura*. Butler's publication was published in April, we could not find the date of publication of Möschler's publication. We followed Araujo, Pinheiro & Duarte [2019] who mention Butler, as the author of the change of status of *stellifera*.

In BOLD, *M. obscurus* appears under 4 BINs: [AAD0077], [AAF1123], [ACE5637], and [ACB6506]. I considered that BIN AAD0077 represents *Moeschlerius obscurus*, a species occurring from Costa Rica to Argentina via Guyana. It should be noted that under the same habitus, 3 undetermined species are present, in Costa Rica [ACE5637], Panama [AAF1123] and French Guiana [ACB6506].
In the list of references above, a doubt remains on the specimens located in the north of Costa Rica: Nicaragua, Honduras and Mexico, because no specimen from these countries has been sequenced. A doubt also remains with the specimens from Ecuador which are the most distant from the specimens from French Guiana. These will have to be dissected to confirm their conspecificity.

Photo de l'holotype d'*Aclytia obscura* (ZMHU) examinée.

A photograph of the holotype of *Aclytia obscura* (ZMHU) has been examined.

Espèce capturée au piège lumineux et sur fleurs la nuit.

Species caught at light trap and on flowers at night.

Matériel examiné. – 81 spécimens (coll. JAC, PC, TR, BH, BF, TT, ML, OL, SF).

Guyane française

Zone Oyapock : St. Georges (Bourg), N2 (pk.7 & pk.10), Approuague (saut Mapaou) ;
Zone Montsinéry : Mtgne des Chevaux, route de Nancibo (pk.2), piste de Saut Léodate (pk.18) ;
Zone Mtgne de Kaw : Patawa, route de Kaw (pk.3,5, 38 & 45) ;
Zone Coralie-Cacao : Cacao, crique Bagot (DZ9), pistes forestières de Coralie, Camp Changement, auberge des Orpailleurs ;
Zone Bélizon : pistes forestières, N2 (pk.104) ;
Zone Nouragues-Arataï : Inselberg ;
Zone Sinnamary : route de petit Saut (pk.1), Pointe Combi ;
Zone Mtgne Trinité : Bénitier ;
Zone Bas-Maroni : D11 pk.7,5, plateau des Mines, Crique Awara, route d'Apatou (pk.15, 17 & 29), Moutouchi ;
Zone massif Dékou Dékou : Boeuf Mort ;
Zone Grand Santi : à 3km de l'aérodrome ;
Zone Centrale : St. Léon-Guérilla, Saül (bourg, aérodrome, environs & Mt. Galbao) ;
Zone Haut-Maroni : Papaïchton (crique Bamba), Antecume Pata ;
Zone Tumuc Humac : Mitaraka-sud.
- Toute l'année.

Brésil : Maranhão. Juillet.

Venezuela : Bolivar : El Dorado. Août.

Guyana : Rockstone : Linder east Demerara, avril.

Paraguay :
- Alto Parana : Puerto Bertoni, Estancia Dimas, Itabo. De juillet à septembre.
- Kanindeyu. Août.

Bolivie : Cochabamba : rte Cristal Mayu-Cochabamba pk.37. Novembre.

Pérou : Junin : Satipo-Rio Tambo (réserve Ashaninka. Août.

Hyaleucerea Butler, 1875

Espèce type : ***Glaucopis erythrotelus*** Walker, 1854, par désignation originale.

• ***Hyaleucerea erythrotela*** (Walker, 1854)

(Pl. 2, Fig. 7 ; Pl. 4, Fig. 15a-e)

Glaucopis erythrotelus Walker, 1854, List Spec. Lepid. Ins. Coll. Br. Mus. 1: 137 & 147.
- Pará.

Hyaleucerea erythrotelus [*sic*]; Butler, 1875, An. Mag. of Nat. Hist. (4) 15: 399.

Hyaleucerea erythrotelus [*sic*]; Butler, 1876, Jour. of the Linnean Soc. XII (60-62): 430.

Planche 3. Genitalia ♂.

a. Vue de face. **b**. Vue de dos. **c**. Vue latérale droite. **d**. Vue latérale gauche. **e**. Détail valve gauche. **f**. Aedeagus. **11**. *P. zeus* Guyane. **12**. *D. espinozai* Guyane. **13**. *D. pernauti* Guyane. **14**. *M. obscurus* Guyane.

Hyaleucerea erythrotelus [*sic*]; Butler, 1877, Ill. of Typ. Speci. of Lepido. Hetero. Brit. Mus.: 51, pl. 7, fig.13.
- Pará.

Hyaleucerea erythrotelus [*sic*]; Kirby, 1892, Syn. Cat. Lepid. Heterocera 1: 203.
- Para.

Hyaleucerea erythrotelus [*sic*]; Druce, 1897, Insecta. Lepidoptera-Heterocera. Biologia Centrali Americana vol. 2 : 365.
- Honduras ; Amazons : Pará. [In part.].

Hyaleucerea erythrotelus [*sic*]; Hampson, 1898, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. 1: 535, fig.283.
- Amazons : Pará.

Hyaleucerea erythrotelus [*sic*]; Druce, 1900, Insecta Lepidoptera-Heterocera. Biologia Centrali Americana vol. 2 : 596.

Hyaleucerea erythrotelus [*sic*]; Klages, 1906, Proc. U.S. Nat. Mus. 29: 552.
- Venezuela : Suapure.

Hyaleucerea erythrotela; Zerny, 1912, Lepidopterorum Catalogus 7: 152.
- Honduras ; Venezuela ; Pará. [In part.].

Hyaleucerea erythrotela; Draudt, 1916, *in* Seitz, Macrolép. du Globe 6 [version française]: 204, pl. 26, fig. i[2].
- Honduras ; Vénézuela ; Guyane ; Pará.

Hyaleucerea erythrotela; Zerny, 1931, Ann. Naturh. Mus. Wien, Bd. 45: 263.
- Pará (Taperinha) [avril-mai, de septembre à décembre] ; Honduras (?) ; Venezuela (Caura-Tal) ; Franz.-Guyana.

Hyaleucerea erythrotela; Hagmann, 1938, Liv. Jubilar. Prof. Travassos, Rio Janeiro: 194.
- [Brazil] : Pará ; Guyanas ; Venezuela : Rio Caura e Ilha Trinidade. [in part].

Hyaleucerea erythrotela; Rego Barros & Machado, 1971, Arq. do Mus. Nat. LIV: 171-172, fig. 1-8.
- Pará.

Hyaleucerea erythrotel[us]; Watson, Fletcher & Nye, 1995, Noctuoidea: Arctiidae to Thyretidae *in* Nye: 89.
- [Brazil] : Para.

Hyaleucerea erythrotelus [*sic*]; Grados, 1997, Biodiversity Assessment & Monitoring, *SI/MAB Serie#* 1: 130.
- Perú: lower Urubamba region.

Hyaleucerea erythrotelus [*sic*]; Grados, 1999, Rev. Peru. Entomol. 41: 13.
- Perú : Madre de Dios (reservada Tambopata-Candamo).

Hyaleucerea erythrotelus [*sic*]; Grados, 2001, Rev. Peru. Entomol. 42: 66.
- Perú : Cuzco-región del Bajo Río Urubamba (Las Malvinas 380-480m, San Martín 475m, Cashiriari 590m).

Hyaleucerea erythrotel[us]; Pinheiro & Duarte, 2013, Florida Entomologist, 96(2): 355.

Hyaleucerea erythrotela; Teston & Correa, 2015, Check List 11(2): 4.
- Brasil : Pará (Serra do Pardo National Park).

Hyaleucerea erythrotela; Teston & al., 2019, Biota Neotrop. 19(2): 11.
- Brazil : Pará (Altamira-Serra do Pardo National Park, [Belem], Santarem-Taperinha, São Félix do Xingu-Serra do Pardo National Park).

Hyaleucerea erythrotela; Araujo, Pinheiro & Duarte, 2019, Zootaxa, 4613(1): 188, fig. 1c.
- Brazil : Pará (Santarem-Fazenda Taperinha).

Hyaleucerea erythrotela; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9 : 25-26, fig. 13 ; pl. 4, fig. 26 & 30a-e.
- Guyane ; Pérou.

Notes. – La localité Honduras signalée par Zerny [1912] et Draudt [1916] doit être supprimée, les spécimens d'Amérique Centrale sont une autre espèce.

The Honduras locality reported by Zerny [1912] and Draudt [1916] must be deleted, the specimens from Central America are another species.

Photo de l'holotype de *Glaucopis erythrotelus* (NHM) examinée.

A photograph of the holotype of *Glaucopis erythrotelus* (NHM) has been examined.

Espèce capturée au piège lumineux, sur fleurs, au piège Malaise, et aux pyrrolizidines.

Species caught at light trap, on flowers, in the Malaise trap, and with pyrrolizidine baits.

Matériel examiné. – 66 spécimens (coll. JAC, PC, TR, BH, TT, ML, OL, SF).

Guyane française
Zone Trois Sauts : Mont St. Marcel ;
Zone Camopi : Dégrad Laurens ;
Zone Oyapock : N2 (Camp Ribal, pk.128), Appouague (saut Mapaou) ;
Zone Ouanary : Monts de l'Observatoire ;
Zone Mtgne de Kaw : camp Caïman, Patawa, route de Kaw (pk. 15, 27,5, 38 & 40), dégrad de Kaw ;
Zone Montsinéry : piste de Saut Léodate (pk.18) ;
Zone Coralie-Cacao : Camp Changement ;
Zone Bélizon : pistes forestières, camp Bonaventure ;
Zone Kourou : piste Soumourou, route dégrad Saramaca (pk.4) ;
Zone Sinnamary : route de petit Saut (pk.19 & 22), Pointe Combi ;
Zone Mtgne Trinité ;
Zone Iracoubo : forêt de Patagaï, Trou Poissons, Mtgne de Fer, piste Dégrad Florian ;
Zone Bas-Maroni : plateau des Mines, rte d'Apatou (pk.25,5 & 28), Moutouchi, piste Paul Isnard, piste crique Serpent ;
Zone Grand Santi : à 3km de l'aérodrome ;
Zone Haut-Maroni : Papaïchton (crique Bamba) ;
Zone Centrale : Saül (environs & Mont Galbao).
- De juin à mars.

Venezuela : Bolivar : El Dorado. Août.

Bolivie : Alto Beni : rte Caranavi-Sta. Anna pk.52. Novembre.

• ***Hyaleucerea cincta*** (Schaus, 1896)
(Pl. 2, Fig. 6 ; Pl. 4, Fig. 16a-e)

Eucereon cinctum Schaus, 1896, Jour. New York Entomol. Soc. IV: 134.
- Trinidad.

Eucereum [*sic*] *cinctum*; Zerny, 1912, Lepidopterorum Catalogus 7: 138. [Emendation erronée].
- Trinidad.

Eucereon cincta [*sic*]; Hampson, 1914, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. Suppl. 1: 324, pl.18, fig.19. [Emendation erronée].
- Venezuela : Caura Vally (Aroa).

Eucereon cinctum; Draudt, 1916, *in* Seitz, Macrolép. du Globe 6 [version française]: 181, pl. 30, fig. d[8].
- Trinité.

Eucereon cinctum; Kaye & Lamont, 1927, Mem. Dept. Agric. Trinidad and Tobago 3. 11.
- Amazon ; Trinidad : Botanic Garden, Caparo (W. Central Trinidad). [in part].

Eucereon cinctum; Fleming, 1959, Zoologica 44(3): 97, pl.3, fig. 1.
- Trinidad ; Venezuela : Aroa.

Eucereon cinctum; Pinheiro & Duarte, 2013, Florida Entomologist, 96(2): 355.

Hyaleucerea cincta; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9 : 25-26, fig. 13 ; pl. 4, fig. 27 & 31a-e.
- Guyane.

Historique. – Hampson [1898], considère *Eucereon latifascia* ; Butler (*nec* Walker), 1876 comme un synonyme plus récent d'*Eucereon cinctum* Schaus, 1896.
Hampson [1905], considère *Eucereon cinctum*; Hampson, 1898, comme une identification erronée d'*Eucereon cinctum* Schaus, 1896, et la renomme *E. metoidesis*.

Hampson [1898], considered *Eucereon latifascia*; Butler (*nec* Walker), 1876 as a junior synonym of *Eucereon cinctum* Schaus, 1896.
Hampson [1905], considered *Eucereon cinctum*; Hampson, 1898, as a misidentification d'*Eucereon cinctum* Schaus, 1896, and renamed it *E. metoidesis*.

Notes. – Kaye & Lamont [1927] signalent *H. cincta* de l'Amazone sans autre précision. La localité devra être confirmée et précisée.
Fleming [1959], signale que le type ne provient pas de Trinidad mais d'Aroa au Venezuela. Nous avons donc considéré les spécimens de



Planche 4. Genitalia ♂.

a. Vue de face. **b**. Vue de dos. **c**. Vue latérale droite. **d**. Vue latérale gauche. **e**. Aedeagus.
15. *H. erythrotela* Guyane. **16**. *H. cincta* Guyane. **17**. *N. suffusus* Guyane. **18** *N. aureus* Guyane.

Guyane conspécifiques de l'holotype, bien qu'aucun spécimen de ces deux pays n'ait été séquencé. Des spécimens du Brésil (Parana) et du Pérou ayant des habitus similaires aux spécimens types du Venezuela ont été séquencés, les spécimens du Parana et du Pérou s'avèrent être deux espèces différentes. Il est possible qu'une des deux soit conspécifique de *H. cincta*.

Kaye & Lamont [1927] reported *H. cincta* from the Amazon without further details. The locality will need to be confirmed and clarified. Fleming [1959], reported that the type did not come from Trinidad but from Aroa in Venezuela. I therefore considered the specimens from French Guiana conspecific with the holotype, although no specimens from these two countries were sequenced. Specimens from Brazil (Parana) and Peru with similar habitus to the type specimens from Venezuela were sequenced, the specimens from Parana and Peru turned out to be two different species. It is possible that one of the two is conspecific with *H. cincta*.

Photo de l'holotype d'*Eucereon cinctum* (USNM) examinée.

A photograph of the holotype of *Euceron cinctum* (USNM) has been examined.

Espèce capturée au piège lumineux.

Species caught at light trap.

Matériel examiné. – 8 spécimens (coll. JAC, PC, SF).

Guyane française

Zone Bas-Maroni : Apatou (piste forestière pk. 20) ;
Zone Haut-Maroni : Papaïchton (Mont Kotica) ;
Zone Centrale : Saül (Mt. Galbao) ;
Zone Massif Emerillon : Mt. Itoupé (DZ 570 m) ;

- Mars, juillet, septembre-octobre.

Nitoris Cerda, 2020

Espèce type : ***Neacerea suffusa*** Lathy, 1899, par désignation originale.

• ***Nitoris suffusus*** (Lathy, 1899)

(Pl. 2, Fig. 9 ; Pl. 4, Fig. 17a-e)

Neacerea suffusa Lathy, 1899, The Entomologist XXXII: 120.
- [Guyana] : Demerara.

Delphyre suffusa; Zerny, 1912, Lepidopterorum Catalogus 7: 136.
- Brit.-Guayana.

Heliura suffusa; Hampson, 1914, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. Suppl. 1: 306, pl.17, fig.19.
- Guyana : Demerara.

Heliura suffusa; Draudt, 1916, *in* Seitz, Macrolép. du Globe 6 [version française]: 179, pl. 24, fig. e[1].
- De la Guyane française jusque vers Santos. [In part.].

Heliura suffusa; Zerny, 1931, Ann. Naturh. Mus. Wien, Bd. 45: 258. Pará (Taperinha) [janvier, juillet, octobre];
- Brit.- und Franz.-Guyana ; São Paulo. [In part.].

Heliura suffusa; Hagmann, 1938, Liv. Jubilar. Prof. Travassos, Rio Janeiro: 194.
- [Brazil] : Pará ; Guyanas ; Venezuela : Rio Caura e Ilha Trinidade. [in part].

Heliura suffusa; Fleming, 1950, Zoologica 35(3): 213.
- British Guyana : Kartabo ; French Guiana to south Brazil. [In part.].

Heliura suffusa; Fleming, 1959, Zoologica 44(3): 96, pl.2, fig. 30.
- Trinidad ; British Guyana.

Heliura suffusa; Betz, 1974, Ann. Soc. Entomol. Fr. (79): 40.
- Guyane Française.

Heliura suffusa; Piñas & Manzano, 2003, Mariposas del Ecuador vol. 21b : 41, fig. 281-282.
- Ecuador : Oriente-Orellana (Yasuní 350m)-Zamora (Zamora 1000 m).

Heliura suffusa; Teston & Correa, 2015, Check List 11(2): 4.
- Brasil : Pará (Serra do Pardo National Park).

Heliura suffusa; Teston & al., 2019, Biota Neotrop. 19(2): 11.
- Brazil : Pará (Santarem-Taperinha, São Félix do Xingu-Serra do Pardo National park); Rondonia (Cacauândia).

Nitoris suffusus; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9 : 28-31, fig. 15 ; pl. 5, fig. 35 & 39a-d.
- Guyane.

Heliura lemoulti Rothschild, 1912, Novitates Zoologicae 19 (2): 168.
- St. Laurent du Maroni, Cayenne.

Delphyre lemoulti; Hampson, 1914, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. Suppl. 1: 298, pl.17, fig.1.
- Fr. Guiana : St. Laurent Maroni.

Delphyre lemoulti; Draudt, 1916, *in* Seitz, Macrolép. du Globe 6 [version française]: 175, pl. 30, fig. a[3].
- Cayenne.

Neacerea lemoulti; Grados, 1997, Biodiversity Assessment & Monitoring, *SI/MAB Serie*# 1: 130.
- [Pérou] : lower Urubamba region.

Delphyre lemoulti; Grados, 1999, Rev. Peru. Entomol. 41: 12.
- Perú : Zona Reservada Tambopata-Candamo, Madre de Dios.

Delphyre lemoulti; Grados, 2001, Rev. Peru. Entomol. 42: 65.
- Perú : Cuzco-región del Bajo Río Urubamba (Segakiato 280 m, Las Malvinas 380-480m, San Martín 475m, Cashiriari 590 m).

Historique. – Cerda [2020], considère *Heliura lemoulti* Rothschild, 1912, comme un synonyme plus récent de *Neacerea suffusa* Lathy, 1899.

Cerda [2020], considers *Heliura lemoulti* Rothschild, 1912, as a junior synonym of *Neacerea suffusa* Lathy, 1899.

Notes. – Nous avons considéré les spécimens de *suffusa* d'Argentine de Köhler [1924] et d'Itatiaya de Zikán [1928] comme étant des identifications erronées. Les spécimens devraient correspondre à *N. hecale* (Schaus, 1892), dont le type est de Pétropolis.
Deux spécimens, un du Panama et l'autre du Costa Rica ayant le même habitus que *N. suffusa* ont été séquencés [BOLD:AAM5154]. Ces spécimens sont pour le moment indéterminés. Il est possible que les spécimens du Pérou et d'Equateur identifiés en tant que *N. suffusa* ne soient pas conspécifiques des spécimens de *suffusa* du plateau des Guyanes. Les citations du Pérou et d'Equateur devront donc être confirmées ainsi que celles du Sud Brésil.

I considered the Argentine *suffusa* specimens of Köhler [1924] and Itatiaya of Zikán [1928] to be erroneous identifications. The specimens should correspond to *N. hecale* (Schaus, 1892), which type is from Petropolis.
Two specimens, one from Panama and one from Costa Rica with the same habitus as *N. suffusa* have been sequenced [BOLD:AAM5154]. These specimens are currently undetermined. It is possible that the specimens from Peru and Ecuador identified as *N. suffusa* are not conspecific with the specimens of *suffusa* from the Guiana Shelf. The citations from Peru and Ecuador will therefore need to be confirmed as well as those of South Brazil.

Photos des holotypes de *Neacerea suffusa* et *Heliura lemoulti* (NHM) examinées.

Photographs of the holotypes of *Neacerea suffusa* and *Heliura lemoulti* (NHM) have been examined.

Espèce capturée au piège lumineux et à vue.

Species caught at light trap and in flight.

Matériel examiné. – 51 spécimens (coll. JAC, PC, BH, TT, BF, ML, OL, SF).

Guyane française

Zone Oyapock : N2 (Pk.7, 14, 17 & 125) ;
Zone Mtgne de Kaw : Patawa, route de Kaw (pk.3,5, 11, 29, 37, 38 & 40) ;
Zone Montsinéry : Galion, Mtgne des Chevaux ;
Zone Coralie-Cacao : dégrad Kwata, Camp Changement, Carbets de Coralie, rte du dégrad Corrèze (scierie) ;
Zone Bélizon : piste forestière (pk.4), piste Tibourou, N2 (pk.79), auberge de l'Approuague ;
Zone Kourou : Chawari, Mtgne des Singes, N1 (pk.70) ;
Zone Sinnamary : crique Canceler, Pointe Combi ;
Zone Bas-Maroni : ile Portal, rte d'Apatou (pk. 17) ;

Zone Centrale : Saül (aérodrome).
- De juin à mars.

Trinidad : N. Range Forest 600 m. Mai.

• ***Nitoris aureus*** Cerda 2020

(Pl. 2, Fig. 10 ; Pl. 4, Fig. 18a-e)

Nitoris aureus Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9 : 28-31, fig. 15 ; pl. 5, fig. 34 & 38a-d.
- Guyane.

Espèce capturée au piège lumineux et au piège Malaise.
Species caught at light trap and in the Malaise trap.

Matériel examiné. – 101 spécimens (coll. JAC, PC, BH, ML, TT, ML, OL, SF).

Guyane française
Zone Oyapock : Saut Maripa, N2 (pk.125 & 128) ;
Zone Nouragues-Arataï : Mont Chauve ;
Zone Mtgne de Kaw : Patawa, route de Kaw (pk.3,5, 28-29, 32-35 & 37-41) ;
Zone Coralie-Cacao : Camp Changement ;
Zone Bélizon : pistes forestières (pk.78), auberge de l'Approuague.
- Toute l'année.

Fraudulentus Cerda, 2020

Espèce type : ***Eucereon metoidesis*** Hampson, 1905, par désignation originale.

• ***Fraudulentus metoidesis metoidesis*** (Hampson, 1905)

(Pl. 2, fig. 8 ; pl. 5, fig. 20a-e)

Acridopsis latifascia; Butler, 1876 (*nec* Walker), Jour. of the Linnean Soc. XII (60-62): 419, pl. 29, fig. 14.
- Pará.

Eucereon cinctum; Hampson, 1898 (*nec* Schaus), Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. 1: 486, fig. 271.
- Trinidad ; Amazons : Pará. [in part.].

Eucereon metoidesis Hampson, 1905, Ann. Mag. Nat. Hist. (7)XV: 430.

Eucereum[*sic*] *metoedesis*[*sic*]; Zerny, 1912, Lepidopterorum Catalogus 7: 141. [Emendation erronée].
- Pará.

Eucereon metoidesis; Hampson, 1914, Cat. Lepid. Phalaenae Br. Mus. Suppl. 1: 317.

Eucereon metoidesis; Draudt, 1916, *in* Seitz, Macrolép. du Globe 6 [version française]: 181-182, pl. 24, fig. h[2].
- Guyane française et Amazone.

Eucereon metoedesis [*sic*]; Zerny, 1931, Ann. Naturh. Mus. Wien, Bd. 45: 259.
- Pará (Taperinha) [de décembre à mars, juillet, octobre] ; Franz.-Guyana.

Eucereon metoedesis[*sic*]; Hagmann, 1938, Liv. Jubilar. Prof. Travassos, Rio Janeiro: 194.
- [Brazil] : Pará ; Guyanas ; Venezuela : Rio Caura e Ilha Trinidade. [in part.]

Eucereon metoïdesis; Betz, 1972, Ann. Soc. Entomol. Fr. 8(2): 406.
- De Guyane française (forêt de Balaté) à l'Amazonie.

Eucereon metoides [sic]; Betz, 1980, Bull. Soc. Entomol. Fr. (85): 91.
- Guyane Française : Kourou.

Planche 5. Genitalia ♂.

a. Vue de face. **b**. Vue de dos. **c**. Vue latérale droite. **d**. Vue latérale gauche. **e**. Aedeagus.
19. *A. aoris* Guyane. **20**. *F. metoidesis* Guyane.

Eucereum [*sic*] *metoidesis*; Grados, 1997, Biodiversity Assessment & Monitoring, *SI/MAB Serie*# 1: 130.
- Perú : lower Urubamba region.

Eucereon metoidesis; Grados, 2001, Rev. Peru. Entomol. 42: 65.
- Perú : Cuzco-región del Bajo Río Urubamba (San Martín 475m).

Eucereon metoidesis; Pinheiro & Duarte, 2013, Florida Entomologist, 96(2): 355, fig.9.

Eucereon metoidesis; Pinheiro & Duarte, 2016, An. Soc. Entomol. de Fr. ((N.S.): 17 & 19.

Eucereon metoidesis; Teston & al., 2019, Biota Neotrop. 19(2): 9.
- Brazil : Amazonas (São Gabriel da Cachoeira, Taracúa), Amapa (Serra do Navio), Pará ([Belem], Belterra- National Forest of Tapajós, Santarem-Taperinha).

Fraudulentus metoidesis; Cerda, 2020, Mémoires Soc. Linnéenne de Lyon n°9 : 33-35, fig. 17 ; pl. 4, fig. 28 & 32a-e.
- Guyane.

Eucereon theophanes Schaus, 1924, Proc. U.S.Nat. Mus. 65: 17.
- British Guyana : Rio Porato.

Eucereon theophanes; Fleming, 1950, Zoologica 35(3): 213.
- British Guyana : Kartabo.

Historique. – Hampson [1898], pour sa description d'*Eucereon cinctum* Schaus, 1896, utilise le spécimen d'*Acridopsis latifascia*; Butler, 1876 (*nec* Walker).
Hampson [1905], s'apercevant de son erreur, considère le spécimen d'*Acridopsis latifascia*; Butler, 1876 (*nec* Walker) non conspécifique d'*Eucereon cinctum* et le nomme *Eucereon metoidesis*.
Bryk [1953], décrit la forme « *romani* ».
Pinheiro & Duarte [2013] considère *Eucereon theophanes* Schaus, 1924, comme un synonyme plus récent d'*Eucereon metoidesis* Hampson, 1905. Ils considèrent aussi, en accord avec l'article 45.6.4 du code *Eucereon metoidesis romani* Bryk, 1953 comme une sous espèce.

Hampson [1898], for his description of *Eucereon cinctum* Schaus, 1896, uses the specimen of *Acridopsis latifascia*; Butler, 1876 (*nec* Walker).
Hampson [1905], realizing his error, considers the specimen of *Acridopsis latifascia*; Butler, 1876 (*nec* Walker) non-conspecific with *Eucereon cinctum* and names it *Eucereon metoidesis*.
Bryk [1953], describes the form "*romani*".
Pinheiro & Duarte [2013], consider *Eucereon theophanes* Schaus, 1924, as a junior synonym of *Eucereon metoidesis* Hampson, 1905. They also consider in accordance with article 45.6.4 of the code *Eucereon metoidesis romani* Bryk, 1953 as a subspecies.

Notes. – La description d'*Eucereon metoidesis* Hampson, 1905 est en fait la description d'*Eucereon cinctum*; Hampson, 1898 (*nec* Schaus). L'holotype d'*Eucereon metoidesis* au NHM est le spécimen du Pará d'*Acridopsis latifascia*; Butler, 1876 (*nec* Walker). Aucun spécimen du Pérou et de Colombie n'a été séquencé, ces 2 localités devrons être confirmées.

The description of *Eucereon metoidesis* hampson, 1905 is in fact the description of *Eucereon cinctum*; Hampson, 1898 (*nec*. Schaus). The holotype of *Eucereon metoidesis* at the NHM is the Pará specimen of *Acridopsis latifascia*; Butler, 1876 (*nec* Walker).
No specimens from Peru and Colombia have been sequenced; these two locations will need to be confirmed.

Photos des holotypes d'*Eucereon metoidesis* Hampson, 1905 (NHM) et d'*Eucereon theophanes* Schaus, 1924 (USNM) examinées.

Photographs of the holotypes of *Eucereon metoidesis* Hampson, 1905 (NHM) and *Eucereon theophanes* Schaus, 1924 (USNM) examined.

Espèce capturée au piège lumineux, sur fleurs de nuit et au piège Malaise.

Species caught at light trap, on flowers at night and in the Malaise trap.

Matériel examiné. – 154 spécimens (coll. JAC, PC, TR, BH, TT, BF, ML, OL, SF).

Guyane française
Zone Trois Saut : Mont St. Marcel ;
Zone Oyapock : St. Georges, N2 (pk.4, 7, 76,5 & 128), Approuague (saut Mapaou) ;
Zone Ouanary : Monts de l'Observatoire ;
Zone Mtgne de Kaw : Patawa, route de Kaw (pk.2, 7, 28- 29, 34, 38-40 & 42) ;
Zone Montsinéry : Galion, piste de Saut Léodate, N1 (pk.28,5) ;
Zone Coralie-Cacao : crique Bagot (dégrad Kwata), carbet Coralie (parking d'altitude), Camp Changement, pistes forestières, Carbets Coralie, N2 (pk.41), auberge des Orpailleurs ;
Zone Bélizon : N2 (pk.76,7, 79 & 104), pistes forestières de Coralie (pk.27) ;
Zone Nouragues-Arataï : Nouragues ;
Zone Montsinéry : piste de Nancibo ;
Île de Cayenne : Îlet Cariacou ;
Zone Kourou : Mtgne des Singes ;
Zone Sinnamary : route de Petit Saut (pk.9, 19 & 22), Pointe Combi ;
Zone Iracoubo : piste de Patagaï, Trou Poissons, Mtgne de Fer, savane Flèche, piste dégrad Florian ;
Zone Mtgne Trinité : DZ (636m) ;
Zone Bas-Maroni : D11 (pk.7,5), St. Jean, plateau des Mines, Awara, village Espérance, piste Paul Isnard, piste Crique Serpent, route d'Apatou (pk.28), Moutouchi ;
Zone Centrale : Saül (bourg, aérodrome & environs) ;
Zone Haut-Maroni : Kayodé, Antecume Pata, Grand Inini (Saut Batardeau).
- Toute l'année.

Colombie : Valle : C. C. Hq. Bajo Calima 90m. Janvier. ?

Remerciements

Je tiens tout particulièrement à remercier Michel Laguerre (Bordeaux) pour la qualité des préparations et photographies des genitalia et la relecture de cet article avec Daniel Herbin (France, Gardech).

Références

Anduze P., 1938. – Un Viaje a Orient - Estados Sucre y Monagas Mayo a agosto de 1938. *Boletin de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales*, IV(32): 281-307.

Araujo E. C., Pinheiro L. R. & Duarte M., 2019. – Comparative morphology and taxonomy of tiger moth genus Epanycles Butler (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, Arctiini, Ctenuchina), with notes on related genera. *Zootaxa*, 4613(1): 187-199.

Beebe W. & Kenedy R., 1957. – Habits, Palatability and Mimicry in Thirteen Ctenuchid Moth Species from Trinidad, B.W.I. *Zoologica*, 42(4) : 147-157.

Betz J. T., 1972. – Contribution à la connaissance des Lépidoptères Amatidae de la Guyane française (1). *Annales de la Société entomologique de France*, 8(2): 397-407.

Betz J. T., 1974. – Contribution à la connaissance des Lépidoptères Amatidae de la Guyane française (2ème note). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 79: 38-42.

Betz J. T., 1980. – Exploration entomologique de la Guyane française et du Moyen Xingu au Brésil. Lepidoptera Amatidae. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 85: 88-93.

Blest A. D., 1964. – Protective Display and Sound Production in Some New World Arctiid and Ctenuchiid Moths. *Zoologica*, 49(3): 161-181.

Borror D. J., 1960. – Dictionary of word roots and combining forms. *Mayfield Publishing Company*: 1-134.



Figure 1. Zones de collectes avec les principaux sites de récoltes.

Butler A. G., 1875. – Description of new Genera and Species of Lepidoptera in the Collection of the British Museum. *The Annals and Magazine of Natural History*, (4)15: 396-399.

Butler A. G., 1876. – Notes on the Lepidoptera of the family Zygaenidae, with descriptions of new Genera and Species. *Journal of the Linnean Society, Zool*., XII: 342-433, 3 pl.

Butler A. G., 1877. – Illustrations of Typical Specimens of Lepidoptera Heterocera in the collection of the British Museum I. *London*: 62 pp., x-xiii (index), 20 pl.

Butler A. G., 1878. – On the Lepidoptera of the Amazons, collected by Dr James W. H. Trail during the years 1873 to 1875. *Transactions of the Entomological Society of London*, I: p. 39-84.

Cerda J.-A., 2020. – Révision partielle des genres Delphyre, Prosopidia, Mesocerea, Apocerea, Heliura, Eucereon, Euceriodes Hyaleucerea, et Pseudohyaleucerea, comportant la création et revalidation de nombreux genres, avec la description de nouvelles espèces. *Mémoires de la Société Linnéenne de Lyon*, 9: 153pp., 71 figs., 28 pl.-216 figs.

Cerda J.-A., 2025. – Ctenuchina de Guyane française (2ème partie). Les genres *Euagra-Micragrella-Parastatia* & *Agyrta* (1er article) 17è note. *Faunitaxys* 13(42): 1-19. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-13(42)

Delphina M. C. & Teston J. A., 2013. – Arctiinae (lepidoptera, Arctiidae) ocorrentes em uma áera de pastagem na Amazônia Oriental em Altamira, Pará, Brasil. *Acta Amazonica*, 43(1): 81-90.

Draudt M., 1916-1917. – *in* Seitz, Macrolépidoptères du Globe, 6. *Stuttgart*: 38-293. [Version française].

Druce H., 1881-1900. – Biologia Centrali-Americana. – Insecta. Lepidoptera-Heterocera. Vol. I (*TEXT.*). *London, Dulau & Co., Bernard Quaritch* : xxxii + 490 pp.

Druce H., 1881-1900. – Biologia Centrali-Americana. – Insecta. Lepidoptera-Heterocera. Vol. III (*PLATES.*). *London, Dulau & Co., Bernard Quaritch* : 2 pp., 101 pl.

Druce H., 1891-1900. – Biologia Centrali-Americana. – Insecta. Lepidoptera-Heterocera. Vol. II (*TEXT.*). *London, Dulau & Co.,Bernard Quaritch*: ii + 622 pp.

Fleming H., 1950. – The Euchromiidae (Moths) of Kartabo, British Guiana, and Caripito, Venezuela. *Zoologica*, 35(3): 209-216.

Fleming H., 1959. – The Ctenuchidae (Moths) of Trinidad, B. W. I. Part II Ctenuchinae. *Zoologica*, 44(3): 85-104, 3 pl.

Forbes W. T. M., 1939. – The Lepidoptera of Barro Colorado Island, Panama. *Bulletin of the Museum Comparative Zoology, Harvard College*, 85(4): i-viii, 97-322.

Forbes W. T. M., 1942. – The Lepidoptera of Barro Colorado Island, Panama 2. *Bulletin of the Museum Comparative Zoology, Harvard College*, 90(2): 265-405.

Grados J., 1997. – Nocturnal Butterflies (Lepidoptera: Ctenuchinae): Boidiversity Assessment in the Lower Urubamba Region. Biodiversity Assessment and Long-term Monitoring, Lower Urubamba Region, Perú. San Martin-3 and Cashiriari-2. *Smithsonian Institution SI/MAB Biodiversity Program Institute for Conservation Biology SI/MAB Serie #1*: 127-130.

Grados J., 1999. – Lista preliminar de los Ctenuchinae (Lepidoptera: Arctiidae) de la Zona Reservada Tambopata-Candamo, Madre de Dios, Perú. *Revista Peruana de Entomologia*, 41: 9-14.

Grados J., 2001. – Lista de los Ctenuchinae (Lepidoptera: Arctiidae) de la región del Bajo Río Urubamba, Cuzco, Perú. *Revista Peruana de Entomologia*, 42: 61-67.

Hagmann G., 1938. – Syntomideos (Amatideos = Euchromideos) do Estado do Para. *Livro Jubilar do professor Lauro Travassos, Rio Janeiro*: 185-194.

Hampson G. F., 1898. – Catalogue of the Lepidoptera Phalaenae in the British Museum 1. *London*: xxi + 559 pp., 285 fig., 17 pl.

Hampson G. F., 1905. – Descriptions of new Genera and Species of Syntomidae, Arctiadae, Agaristidae, and Noctuidae. *The Annals and Magazine of Natural History*, (7)XV: 425-453.

Hernández-Baz F., Maes J.-M. & Laguerre M., 2004. – Listado Preliminar de los Ctenuchinae (Insecta: Lepidoptera: Noctuoidea: Arctiidae) de Nicaragua. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 64: 1-13.

Hernandez-Baz F., 2012. – Las Polillas Avispa de México (Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae: Ctenuchina y Euchromiina): Biogeographía y Concervatión. *Universidad Veracruzana Centro de Investigaciones Tropicales*: 341pp.

International Commission on Zoological Nomenclature, 1999. – International code of Zoological Nomenclature (4ème édition). *The International Trustfor Zoological Nomenclature*: V-XXIX, 1-306.

Kaye W. J., & Lamont N., 1927. – A Catalogue of the Trinidad Lepidoptera Heterocera (Moths). *Memoirs of the Deptement of Agriculture, Trinidad and Tobago* 3: viii + 144 + xv pp., 2 pl.

Kirby W. F., 1892. – A Synonymic Catalogue of Lepidoptera Heterocera. (Moths) vol. 1: xii + 951 pp.

Klages E. A., 1906. – On the Syntomid Moths of Southern Venezuela Collected in 1898-1900. *Proceedings of the U.S. National Museum*, 29: 531-553.

Köhler P., 1924. – Fauna Argentina Lepidoptera e Collectione Alberto Breyer II Teil Heterocera. Systematisher Katalog und Studien Berichtigungen, Neubeschreibungen. *Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie, Sonderheft, Band XIX, 20* : 1-28, pls 1-8.

Lathy P. I., 1899. – Description of new species of Syntomidae in the Collection of Mr H. J. Adams, F.E.S. *The Entomologist*, XXXII:116-121.

Lichy R., 1938. – Un Viaje a Oriente. Estado Sucre y Monagas mayo a agosto de 1938. *Boletin de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales*, IV(32): 281-307.

Lichy R., 1943. – Observations y Rectificationes sobre Lepidópteros recolectados por P. J. Anduze en los Estados orentales de Sucre y Monogas, cuya enumeracion se publicó en el Boletin de la sociedad Venezuelana de Ciencias Naturales, N° 32. 1938. *Boletin de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales*, VIII(55): 205-232.

Miller J., Y., & al., 2012. – An Annotated List of the Lepidoptera of Honduras. *Insecta Mundi*, 0205: 1-72.

Möschler H. B., 1872. – Neue exotische Schmetterlinge. *Stettinner Entomologische Zeitung*, 33: 336-362.

Möschler H. B., 1878. – Beiträge zur Schmetterlings-Fauna von Surinam. II. *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch- Botanischen Gesellschaft in Wien*, XXVII: 629-700, 3 pl.

Piñas S. J. & Manzano I., 2003. – Mariposas del Ecuador vol. 21b. Familia: Arctiidae. Subfamilia: Ctenuchinae. *Compañía de Jesús*: ii-iii + 91 pp.

Pinheiro L. R. & Duarte M., 2013. – Taxonomic Notes on Ctenuchina, Euchomiina and Phaegopterina (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, Arctiini). *Florida Entomologist*, 96(2): 351-359.

Pinheiro L. R. & Duarte M., 2016. – Description of nine species of Heliura Butler from south America (Lepidoptera,

Figure 2. Carte de répartition des espèces en Amérique néotropical.

3

4

Figures 3 & **4**. Forêt de la Montagne de Kaw, Guyane française.

Erebidae, Arctiinae, Arctiini, Ctenuchina). *Annales de la Société Entomologique de France*, *(N.S.)*: 1-21.

Pinheiro L. R. & Duarte M., 2017. – Revision of the Neotropical moth genus *Ptychotrichos* Schaus (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, Arctiini, Ctenuchina). *Zootaxa*, 4312 (2): 246-258.

Rego Barros A. R. & Machado J. P. Filho, 1971. – Estudo dos Ctenuchidae Neotropicais I. Sobre o Gênero Hyaleucerea Butler, 1875. *Arquivos do Museo Nacional*, 54: 171-177, 11fig.

Rothschild L. W., 1912a. – New Syntomidae. *Novitates Zoologicae*, 19(2): 151-186.

Schaus W., 1894. – On new Species of Heterocera from Tropical America. *Proceedings of the general Meeting for Scientific Business of the Zoological Society of London*: 225-243.

Schaus W., 1896. – New Species of American Heterocera. *Journal of the New York Entomological Society*, 4: 130-145.

Schaus W., 1924. – New Species of Moths in the United States National Museum. *Proceeding of the U.S. National Museum*, 65: 1-37.

Schrottky C., 1909, „Mimetische“ Lepidopteren ein Beitrag zur Kenntnis der Syntomidae Paraguays. *Deutsche Entomologische Zeitschrift „Iris“, Dresden,* 22(2): 122-132.

Teston J. A., Delphina M. C., 2010. – Diversidade de Arctiinae (lepidoptera, Arctiidae) em área alterada em Altamira, Amazônia Oriental, Pará, Brasil. *Acta Amazonica*, 40(2): 387-396.

Teston J. A., Novaes J. B. & Almeida Júnior J. O. B., 2012. – Abundância, Composição e Diversidade de Arctiinae (Lepidoptera, Arctiidae) em um fragmento de floresta na Amazônia Oriental em Altamira, PA, Brasil. *Acta Amazonica*, 42(1): 105-114.

Teston J. A. & Correa D., 2015. – The Arctiini (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae) fauna of the Serra do Pardo National Park, Pará, Brazil. *Check List*, 11(2) 1613: 1-9.

Teston J. A., Abreu D., Ferro V., 2019. – Arctiini [Leach] (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae) of Brasilian Amazon. III – Subtribe Ctenuchina Kirby, 1837. *Biotaneotropica*, 19(2): 1-19.

Travassos L. Filho, 1940b. – Euchromiidae de Salobra. *Arquivas do Zoologie Estado de São Paulo* II(9): 261-280, 2 pl.

Turrent-Diaz R., Pescador Rubio A., 2013. – La fauna de las tribus Euchormini [sic] (Lepidóptera, familia Erebidae) de la región de Chajul Chiapas (Marqués de Comillas). *Revista de la Sociedad Mexicana de Lepidopterología*, 1(1): 1-16.

Walker F., 1854. – List of the Specimens of Lepidopterous Insects in the Collection of the British Museum. Part I.- Lepidoptera Heterocera: 1-278.

Watson A., Fletcher D. S. & Nye I. W. B., 1995. – The Generic Names of Moths of the World Volume 2 (2ème éd.) Noctuoidea: Arctiidae to Thyretidae. *The Natural History Museum, London*: [i]-xiv + 228 pp.

Zerny H., 1912. – Syntomidae. *Lepidopterum Catalogus*, 7: 179 pp.

Zerny H., 1931a. – Beiträge zur Kenntnis der Syntomiden. *Deutsche Entomologische Zeitschrift „Iris“, Dresden,* 45: 1-26, 1 pl

Zerny H., 1931b. – Ergebnisse einer Zoologischen Sammelreise nach Brasilien, Insbesondere in das Amazonzasgebiet, Ausgeführt von Dr. H. Zerny. VII. Teil. Lepidoptera III: Die Syntomiden des Staates Pará. *Annales des Naturhistorischen Museum in Wien,* 45: 225-263.

Zikán C. F., 1928. – Die Macro-Lepidoptera des Itatiaya (Südabhang bei Campo-Bello). *Entomologisches Rundschau*, 45(10): 38-39.

Abstract

Cerda J.-A., 2025. – Ctenuchina from French Guiana (Part 2). The genera *Ptychotricos* - *Delphyre* - *Druceius* - *Aderithales* - *Moeschlerius* - *Hyaleucerea* - *Nitoris* & *Fraudulentus* (Part 2). 18th note. *Faunitaxys*, 13(63) : 1 – 17.

Ten species are treated: *Ptychotricos zeus* Schaus, 1894, *Delphyre espinozai* Cerda, 2020, *Druceius pernauti* Cerda, 2020, *Aderithales aoris* (Möschler, 1878), *Moeschlerius obscurus* (Möschler, 1872), *Hyaleucerea erythrotela* (Walker, 1854), *Hyaleucerea cincta* (Schaus, 1896), *Nitoris suffusus* (Lathy, 1899), *Nitoris aureus* Cerda, 2020, *Fraudulentus metoidesis metoidesis* (Hampson, 1905).

Keywords. – Erebidae, Arctiinae, Arctiini, Ctenuchina, *Delphyre*, *Druceius*, *Aderithales*, *Moeschlerius*, *Hyaleucerea*, *Nitoris*, *Fraudulentus*, French Guiana.

5

Figure 5. Lever de soleil sur la forêt guyanaise.

Faunitaxys

Volume 13, Numéro 63, Décembre 2025

SOMMAIRE

Ctenuchina de Guyane française (2de partie). Les genres *Ptychotricos* - *Delphyre* - *Druceius* - *Aderithales* - *Moeschlerius* - *Hyaleucerea* - *Nitoris* & *Fraudulentus* (2d article). 18e note.

Jean-Aimé Cerda . . . . . 1 – 17

CONTENTS

Ctenuchina from French Guiana (Part 2). The genera *Ptychotricos* - *Delphyre* - *Druceius* - *Aderithales* - *Moeschlerius* - *Hyaleucerea* - *Nitoris* & *Fraudulentus* (Part 2). 18th note.

Jean-Aimé Cerda . . . . . 1 – 17

Illustration de la couverture :

Phrynonax sexcarinatus, Montagne de Kaw - Guyane.

Crédits:

Jean-Aimé Cerda : Planches 1 & 2.
Michel Laguerre : Planches 3-5.
Nicolas Defaux : Fig. 3-4 & couverture.
Jean Marc Wojcik : Fig. 5.

Publié par l'Association Française de Cartographie de la Faune et de la Flore (AFCFF)